

Artwork Version: <b>PROOF Z</b>		Artwork Information Panel		Repro Version:	
Diadeis Suisse SA – YSE – DO-19-E3093 – 06.11.2019 – F27					
<b>Manufacturing Site Number:</b> 6200000045298		<b>Manufacturing Site(s):</b> GSK Nyon – CH		<b>Technical Drawing (Do NOT include version number):</b> 145 x 210 mm – N-PN-NOTICE – P08 – Recto/Verso	
<b>Product Market Trade Name:</b> VOLTAREN EMULGEL 2% 100G CO_946076_PIL		<b>Approving Market(s):</b> CO		<b>Material Spec. (Do NOT include version number):</b> N/A	
<b>Print Process:</b> N/A		<b>Colour Standard Reference:</b> N/A		<b>Material Type:</b> N/A	<b>Printer name / information:</b> N/A
<b>Total Colours &amp; Varnishes: 1</b>				<b>Body Text Size:</b> 8 pts	<b>Smallest Text Size:</b> 8 pts
Black				<b>Leading:</b> 8.5 pts	
<b>Total Special Finishes: N/A</b>				<b>Horizontal Scale:</b> 100%	
				<b>Microtext:</b> N/A	
<b>Project n°:</b> AWF 33487 – OTDC 560839		<b>Pharma code:</b> 1170		<b>Font type:</b> Helvetica Neue LT Pro	
<small>Artwork copyright is the property of the GSK Group of Companies. All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.</small>					

145 mm

72 mm

Pharma code 1170

210 mm

11,5 mm

11,5 mm

9 mm

127 mm

9 mm

acetilsalicílico (una sustancia que también se usa para prevenir la coagulación de la sangre), o cualquiera de los componentes enumerados en la sección "¿Qué contiene Voltaren Emulgel Forte?". Si no está seguro consulte a su médico o profesional de la salud.

Los síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir: sibilancias o dificultad para respirar (asma); erupciones en la piel con ampollas o urticaria; inflamación de la cara o lengua; flujo nasal.

- Se encuentra en los últimos 3 meses de embarazo.

Si alguna de estas le aplica, no use Voltaren Emulgel Forte.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**6. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Voltaren Emulgel Forte?**

No aplique en la piel con condiciones tales como cortadas, heridas abiertas o que presenta sarpullido o eczema. Suspenda el tratamiento si se producen erupciones cutáneas después de aplicar el producto. Evite aplicar en grandes áreas de la piel o por más tiempo del recomendado, a menos de que así lo recomiende su médico.

Únicamente es para uso externo. No lo use en la boca, no ingerir y lavar las manos después de aplicarlo. Evite la aplicación en los ojos, si esto ocurre, debe lavarlos con abundante agua y consultar con su médico o profesional de la salud si persiste cualquier molestia. Voltaren Emulgel Forte puede ser utilizado con vendajes no oclusivos, pero no se debe utilizar con apósitos oclusivos herméticos.

La formulación contiene **propilenglicol** el cual puede causar irritaciones localizadas leves en la piel de algunas personas, y **butilhidroxitolueno** que puede causar reacciones locales en la piel, por ejemplo, dermatitis de contacto o irritación en los ojos y membranas mucosas.

**EMBARAZO / LACTANCIA**

**7. ¿Puede ser utilizado Voltaren Emulgel Forte durante el embarazo o el período de lactancia?**

Si usted está embarazada o en período de lactancia, piensa que puede estar embarazada o está planeando tener un bebé, consulte con su médico o profesional de la salud antes de usar este producto:

- No utilice Voltaren Emulgel Forte si está embarazada, especialmente durante los últimos 3 meses de embarazo, ya que podría afectar al feto o causar problemas durante el parto.
- No utilice el producto durante el período de lactancia.

**USO PEDIATRICO / NIÑOS**

**8. ¿Puede ser usado Voltaren Emulgel Forte en los niños?**

Voltaren Emulgel Forte no debe ser utilizado en niños menores de 12 años de edad.

**REACCIONES SECUNDARIAS**

**9. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Voltaren Emulgel Forte?**

Al igual que todos los medicamentos, el producto puede causar efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufran.

**Algunos efectos secundarios poco frecuentes y muy poco frecuentes pueden ser graves.** Si experimenta alguno de los siguientes signos de alergia, SUSPENDA el uso del producto y consulte a su médico o profesional de la salud inmediatamente:

- Erupción cutánea con ampollas, urticaria (pueden afectar entre 1 a 10 en cada 10.000 personas).
- Sibilancias, dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma) (pueden afectar a menos de 1 en cada 10.000 personas).
- Inflamación de la cara, labios, lengua o garganta (pueden afectar a menos de 1 en cada 10.000 personas).

Otros efectos secundarios que pueden ocurrir son generalmente leves y pasajeros (si le preocupa, consulte con su médico o profesional de la salud).

**Efectos secundarios comunes** (pueden afectar entre 1 y 10 de cada 100 personas)

- Erupción cutánea, enrojecimiento o picazón de la piel.

**Efectos secundarios muy raros** (pueden afectar a menos de 1 en cada 10.000 personas)

- La piel puede estar más sensible al sol. Como posibles signos están quemadura solar con picazón, hinchazón y ampollas.

Si usted presenta cualquier efecto secundario consulte a su médico o profesional de la salud, esto incluye cualquiera no mencionado en este inserto, o infórmelo a través de los siguientes medios de comunicación: **COL:** 018000127333, co.servicio-cliente@gsk.com; **ECU:** 022994751, ec.consumo@gsk.com; **PER:** 0-800-51-475, pe.consumo@gsk.com. Mediante la notificación de efectos secundarios puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este producto.

**INTERACCIONES**

**10. ¿Está tomando otros medicamentos?**

Consulte con su médico o profesional de la salud si está tomando o ha tomado recientemente otro medicamento, incluyendo aquellos sin prescripción médica.

**COMENTARIOS ESPECIALES**

**11. ¿Cómo se debe almacenar Voltaren Emulgel Forte?**

- Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C.
- No utilice el producto después de la fecha de expiración que se indica en el tubo y la caja.

**MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS**

Presentación autorizada para Ecuador: 100g. Fabricado por: GSK Consumer Healthcare S.A., Route de L'Etraz 2, 1260 Nyon, Suiza  
Fecha de la última revisión: **Versión 02 (Agosto de 2017)**  
**PIL 2015-Dec-15/01-S**

Marcas propiedad de o licenciadas al grupo de compañías GSK.  
© 2017 Grupo de compañías de GSK o de su licenciante.

CO 946076 – 6200000045298

Artwork Version: <b>PROOF Z</b>		Artwork Information Panel		Repro Version:	
Diadeis Suisse SA – YSE – DO-19-E3093 – 06.11.2019 – F27					
<b>Manufacturing Site Number:</b> 6200000045298		<b>Manufacturing Site(s):</b> GSK Nyon – CH		<b>Technical Drawing (Do NOT include version number):</b> 145 x 210 mm – N-PN-NOTICE – P08 – Recto/Verso	
<b>Product Market Trade Name:</b> VOLTAREN EMULGEL 2% 100G CO_946076_PIL		<b>Approving Market(s):</b> CO		<b>Material Spec. (Do NOT include version number):</b> N/A	
<b>Print Process:</b> N/A		<b>Colour Standard Reference:</b> N/A		<b>Material Type:</b> N/A	<b>Printer name / information:</b> N/A
<b>Total Colours &amp; Varnishes: 1</b>				<b>Body Text Size:</b> 8 pts	<b>Smallest Text Size:</b> 8 pts
Black				<b>Leading:</b> 8.5 pts	
				<b>Horizontal Scale:</b> 100%	
<b>Total Special Finishes: N/A</b>				<b>Microtext:</b> N/A	
<b>Project n°:</b> AWF 33487 – OTDC 560839		<b>Pharma code:</b> 1170		<b>Font type:</b> Helvetica Neue LT Pro	
<small>Artwork copyright is the property of the GSK Group of Companies. All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification / audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.</small>					

200 mm Measuring Bar